

## RATIONNEMENT FOALS ENTRE 7H ET 22H

**EQUIMILK 130GRS DE POUDRE POUR 1L EAU TIEDE ET SERENOR 200GRS DE POUDRE POUR 1L EAU TIEDE**

**DISTRIBUTION LE PREMIER MOIS ENTRE 7H ET 22 H TOUTES LES HEURES ET DEMIE SOIT 11 REPAS**

2 ERES SEMAINES :

- \*J 1 et J 2 : EQUIMILK 0.5 ml en 11 repas soit 5.5l dans la journée
- \*J 3 et J 4 : EQUIMILK 0.6 ml en 11 repas soit 6.6 l dans la journée
- \* J 5 et J 6: EQUIMILK 0.7 ml en 11 repas soit 7.7 l dans la journée
- \*J 7 et J 8 : EQUIMILK 0.8 ml en 11 repas soit 8.8 l dans la journée

PENSER A LE VERMIFUGER AU PANACUR ENTRE LE 5EME ET LE 8EME JOUR SI LE TROUBLE DIGESTIF APPARAIT AVANT LE 5EME JOUR VERMIFUGEZ LE AUSSITOT . ENSUITE UN VERMIFUGE TOUS LES DEUX MOIS EN CHANGEANT DE MOLECULE JUSQU'AU SEVRAGE. EQUEST ET VERMIFUGES A BASE D'IVERMECTINE APRES 4 MOIS.

\*J 9 et J 10 : EQUIMILK 0.9 ml en 11 repas soit 9.9 l dans la journée

\*J 11 – J 12 et J 13 : 3/4 EQUIMILK ET 1/4 SERENOR 0.9l en 11 repas soit 9.9 l dans la journée

\*J 14 – J 15 et J 16 : 1/2 EQUIMILK ET 1/2 SERENOR 0.9l en 11 repas soit 9.9L dans la journée

\* J 17 – J 18 et J 19 : 1/4 ET 3/4 SERENOR 0.9l en 11 repas soit 9.9l dans la journée.

⑩ A partir de J 20 : 1l en 11 repas soit 11l dans la journée pendant 5 jours .

⑩ J 25 : 1.1 litre par buvée soit 12 litres dans la journée pendant 5 jours.

⑩ A 1 mois : 1.2 litre par buvée soit 13 litres dans la journée.

### DISTRIBUTION LE 2EME MOIS

1.5 L TOUTES LES 2H SOIT 9 REPAS

### DISTRIBUTION LE 3EME MOIS ENTRE 8H ET 22H

2L TOUTES LES 2H30 SOIT 7 REPAS

### DISTRIBUTION LE 4 EME MOIS

2.5L PAR REPAS REPARTIS EN 5 REPAS

### DISTRIBUTION LE 5 EME MOIS

1ERE SEMAINE ET 2EME SEMAINE : 4L EN 3 A 4 REPAS

3EME SEMAINE : REMPLACER UN REPAS DE LAIT SUR LES 3 OU 4 PAR UN REPAS D'EAU

4EME SEMAINE : REMPLACER UN 2EME REPAS DE LAIT PAR DE L'EAU SI VOUS ETIEZ A 3 REPAS PAR JOUR LA SEMAINE SUIVANTE IL EST ENTIEREMENT A L'EAU SINON SI VOUE ETIEZ A 4 REPAS IL LUI RESTE ENCORE UNE SEMAINE AVEC 3 REPAS D'EAU ET UN DE LAIT.

